

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
アバスチン+ F O L F O X 4 （初回）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	5 mg /kg 1 キット	メイン	9 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	グラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3 . 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	85 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	5 - F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		9	5 - F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
	day2	10	グラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3 . 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		11	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		12	5 - F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		13	5 - F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
		14	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠 1日2回		
アバスチン+ F O L F O X 4 （2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	5 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	グラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3 . 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	85 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	5 - F U 注	400 mg /m ²	メイン	1 5 分以内

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			糖液5% 50mL	1 瓶		
		9	5-FU注 糖液5% 500mL	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
	day2	10	ゲラントロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		11	レボホリナート点滴静注用 糖液5% 250mL	100 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		12	5-FU注 糖液5% 50mL	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		13	5-FU注 糖液5% 500mL	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
		14	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
アバスチン＋FOLFIRI（初回）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液100mL	5 mg /kg 1 キット	メイン	9 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	ゲラントロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液500mL	200 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 糖液5% 250mL	150 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		8	5-FU注 糖液5% 50mL	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		9	5-FU注 生理食塩液500mL	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
	day2	10	5-FU注 生理食塩液500mL	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
		11	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
アバスチン＋FOLFIRI（2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液100mL	5 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		5	ゲラニトロン点滴静注パッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液 5 0 0 m L	200 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	リリテカ塩酸塩点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	150 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		8	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		9	5－F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
	day2	10	5－F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠 1日2回		
アバスチン＋IRIS：4週1コース、2投2休	day1、15	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	5 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	ゲラニトロン点滴静注パッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		6	リリテカ塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		7	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	流し
		8	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～15朝	内服薬	S-1	80 mg /m ² 1日2回		
アバスチン（2週毎）＋パクリタキセル（3投1休）：初回コース	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	90 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	流し
		5	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	10 mg /kg 1 キット	メイン	9 0 分
		6	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day8	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	90 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day15	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	90 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	流し
		5	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	10 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		6	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
アバスチン（2週毎）＋パクリタキセル（3投1休）：2コース目以降	day1、15	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	90 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	流し
		5	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	10 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		6	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day8	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	90 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
アービタックス＋FOLFOLX 4（初回）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 管	メイン	5 分

レジメン名称 〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			生理食塩液 5 0 m L	1 瓶		
		3	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		4	ゲラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		5	アービタックス注射液 生理食塩液 5 0 0 m L	400 mg /㎡ 1 袋	メイン	1 2 0 分
		6	生理食塩液 2 0 0 m L	1 瓶 1 2 0 分経過観察	メイン	1 2 0 分
		7	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /㎡ 1 袋	側管	1 2 0 分
		8	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	85 mg /㎡ 1 袋	メイン	1 2 0 分
		9	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /㎡ 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		10	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /㎡ 1 袋	メイン	2 1 時間
		day2	11	ゲラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン
	12		レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /㎡ 1 袋	メイン	1 2 0 分
	13		5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /㎡ 1 瓶	メイン	1 5 分以内
	14		5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /㎡ 1 袋	メイン	2 1 時間
	15		生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
アービタックス＋F O L F O X 4 （2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ボラミン注 5 m g ／ 1 m L 生理食塩液 5 0 m L	1 管 1 瓶	メイン	5 分
		3	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		4	ゲラニトロン点滴静注パック 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		5	アービタックス注射液 生理食塩液 2 5 0 m L	250 mg /㎡ 1 袋	メイン	6 0 分
		6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	3 0 分
		7	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /㎡ 1 袋	側管	1 2 0 分
		8	オキサリプラチン点滴静注液	85 mg /㎡ レボホリナートと同時に	メイン	1 2 0 分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			糖液5% 250mL	1袋		
		9	5-FU注 糖液5% 50mL	400mg /m ² 1瓶	メイン	15分以内
		10	5-FU注 糖液5% 500mL	600mg /m ² 1袋	メイン メイン	21時間
	day2	11	グラネトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液3. 3mg	1袋 1管	メイン	30分
		12	レボホリナート点滴静注用 糖液5% 250mL	100mg /m ² 1袋	メイン	120分
		13	5-FU注 糖液5% 50mL	400mg /m ² 1瓶	メイン	15分以内
		14	5-FU注 糖液5% 500mL	600mg /m ² 1袋	メイン	21時間
		15	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8錠 1日2回		
アービタックス+FOOLFIRI（初回）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	穿刺用
		2	ボララミン注5mg/1mL 生理食塩液50mL	1管 1瓶	メイン	5分
		3	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1瓶 1キット	メイン	30分
		4	グラネトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液3. 3mg	1袋 1管	メイン	30分
		5	アービタックス注射液 生理食塩液500mL	400mg /m ² 1袋	メイン	120分
		6	生理食塩液200mL	1瓶 120分経過観察	メイン	120分
		7	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液500mL	200mg /m ² 1袋	側管	120分
		8	リノテカニ塩酸塩点滴静注液 糖液5% 250mL	150mg /m ² 1袋	メイン	90分
		9	5-FU注 糖液5% 50mL	400mg /m ² 1瓶	メイン	15分以内
		10	5-FU注 生理食塩液500mL	1200mg /m ² 1袋	メイン	24時間
	day2	11	5-FU注 生理食塩液500mL	1200mg /m ² 1袋	メイン	24時間
		12	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8錠 1日2回		
アービタックス+FOOLFIRI（2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	穿刺用
		2	ボララミン注5mg/1mL	1管	メイン	5分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			生理食塩液 5 0 m L	1 瓶		
		3	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		4	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		5	アーピタックス注射液 生理食塩液 2 5 0 m L	250 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	3 0 分
		7	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液 5 0 0 m L	200 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		8	トリナカ塩酸塩点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	150 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		9	5 - F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		10	5 - F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
	day2	11	5 - F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
	day2～4	12	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
		内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠 1日2回		
I R I S （S - 1 + イリノテカン）：4 週 1 コース、2 投 2 休	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		3	トリナカ塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	流し
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day1 夕～15 朝	内服薬	S-1	80 mg /m ² 1日2回		
アクブラ + ドセタキセル（4 週ごと）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		3	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット	メイン	3 0 分
		4	ドセタキセル点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	40 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分以上
		6	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット	メイン	3 0 分
		7	アクブラ静注用 生理食塩液 5 0 0 m L	50 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分以上
		8	ヴィーン F 輸液 5 0 0 m L	1 瓶	メイン	2 時間
		9	Y D ソリター T 3 号輸液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	2 時間

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
イリノテカン+シスプラチン（1投1休）	day1	10	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
		1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		3	マンニトールS注射液300mL	1 瓶	メイン	60分
		4	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		5	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	15分
		6	リリカ塩酸塩点滴静注液 糖液5% 250mL	60 mg /m ² 1 袋	メイン	90分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液500mL	30 mg /m ² 1 袋	メイン	120分
	day2、3	8	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	フラッシュ用
		9	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	フラッシュ用
		10	大塚生食注500mL	1 袋	メイン	90分
		11	デキサート注射液3.3mg 生理食塩液100mL	3 管 1 キット	メイン	30分
		12	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		13	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	フラッシュ用
AC（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分で
		3	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	15分で
		4	注射用エンドキサン 糖液5% 250mL	600 mg /m ² 1 袋	メイン	60分で
		5	ドキシルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液100mL	60 mg /m ² 1 キット	メイン	15分で
		6	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	16 錠	1日2回	
カドサイラ療法（3週毎）：（初回）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	ブライミング用
		3	カドサイラ点滴静注用 生理食塩液250mL	3.6 mg /kg 1 袋	メイン	90分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
カドサイラ療法（3週毎）：（2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	ブライミング用
		3	カドサイラ点滴静注用 生理食塩液250mL	3.6 mg /kg 1 袋	メイン	60分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
カドサイラ療法（3週毎）（初回）：（アレルギー対策用）	day1	4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
		1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液100mL デキサート注射液3.3mg	1 キット 2 管	メイン	30分
		3	カドサイラ点滴静注用 生理食塩液250mL	3.6 mg /kg 1 袋	メイン	90分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
		外用薬	ジクロフェナク坐剤50mg	1 個	カドサイラ投与30分前	
カドサイラ療法（3週毎）（2回目以降）：（アレルギー対策用）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液100mL デキサート注射液3.3mg	1 キット 2 管	メイン	30分
		3	カドサイラ点滴静注用 生理食塩液250mL	3.6 mg /kg 1 袋	メイン	60分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
		外用薬	ジクロフェナク坐剤50mg	1 個	カドサイラ投与30分前	
ゲムシタビン（2投1休）、（3投1休）	day1、8、15	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 1 管	メイン	30分
		3	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液100mL	1000 mg /m ² 1 キット	メイン	30分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
ゲムシタビン+S-1（2投1休）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 1 管	メイン	30分
		3	ゲムシタビン点滴静注用 生理食塩液100mL	1000 mg /m ² 1 キット	メイン	30分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～15朝	内服薬	S-1	60 mg /m ²	1日2回	
サイラムザ（2週毎）+パクリタキセル（3投1休）：初回コース	day1、15	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg ファモチジン注20mg ボララミン注5mg/1mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	流し
		4	サイラムザ点滴静注用 生理食塩液250mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	60分
		5	生理食塩液100mL	1 キット	メイン	60分経過観察
		6	パクリタキセル注 生理食塩液250mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
	day8	7	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
		1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg ファモチジン注用 20 mg ポララミン注 5 mg / 1 mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	パクリタキセル注 生理食塩液 250 mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		4	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
サイラムザ（2週毎）＋パクリタキセル（3投1休）：3コース目以降	day1、15	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg ファモチジン注用 20 mg ポララミン注 5 mg / 1 mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	生理食塩液 50 mL	1 瓶	メイン	流し
		4	サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250 mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	30分
		5	生理食塩液 50 mL	1 瓶	メイン	流し
		6	パクリタキセル注 生理食塩液 250 mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		7	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
	day8	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg ファモチジン注用 20 mg ポララミン注 5 mg / 1 mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	パクリタキセル注 生理食塩液 250 mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		4	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
サイラムザ＋イリノテカン（2週毎）：1～4回コース	day1	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 mg ポララミン注 5 mg / 1 mL	1 袋 3 管 1 管	メイン	30分
		3	生理食塩液 50 mL	1 瓶	メイン	流し
		4	サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250 mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	60分
		5	生理食塩液 100 mL	1 キット	60分経過観察 メイン	60分
		6	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液 500 mL	150 mg /m ² 1 袋	メイン	90分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
サイラムザ＋イリノテカン（2週毎）：5コース以降	day2～3	7	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	抜針用
		内服薬	デカドロン錠0.5mg	16錠 1日2回		
	day1	1	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg ポララミン注5mg/1mL	1袋 3管 1管	メイン	30分
		3	生理食塩液50mL	1瓶	メイン	流し
		4	サイラムザ点滴静注 生理食塩液250mL	8mg/kg 1袋	メイン	30分
		5	生理食塩液50mL	1瓶	メイン	流し
		6	イリノテカン塩酸塩点滴静注 生理食塩液500mL	150mg/m ² 1袋	メイン	90分
		7	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	抜針用
	day2～3	内服薬	デカドロン錠0.5mg	16錠 1日2回		
サイラムザ＋イリノテカン(2週毎)：1～4回コース：制吐剤強化用	day1	1	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1瓶 1キット	メイン	30分
		3	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg ポララミン注5mg/1mL	1袋 1管 1管	メイン	30分
		4	生理食塩液50mL	1瓶	メイン	流し
		5	サイラムザ点滴静注 生理食塩液250mL	8mg/kg 1袋	メイン	60分
		6	生理食塩液100mL	1キット 60分経過観察	メイン	60分
		7	イリノテカン塩酸塩点滴静注 生理食塩液500mL	150mg/m ² 1袋	メイン	90分
		8	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	抜針用
	day2～3	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8錠 1日2回		
サイラムザ＋イリノテカン(2週毎)：5コース以降：制吐剤強化用		1	生食注シリンジ20mL	1筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1瓶 1キット	メイン	30分
		3	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg ポララミン注5mg/1mL	1袋 1管 1管	メイン	30分
		4	生理食塩液50mL	1瓶	メイン	流し
		5	サイラムザ点滴静注 生理食塩液250mL	8mg/kg 1袋	メイン	30分
		6	生理食塩液50mL	1瓶	メイン	流し
		7	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/m ²	メイン	90分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋		
		8	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day2～3	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠	1日2回	
シスプラチン + S - 1（ショートハイドレーション）	day8	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		4	マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 袋	メイン	6 0 分
		5	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		6	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 3 管	メイン	1 5 分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 5 0 0 m L	60 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		9	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		10	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day9、10	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	デキサート注射液 3. 3 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	3 管 1 キット	メイン	3 0 分
		4	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day1～21	内服薬	S-1	80 mg /m ²	1日2回	
XELOX	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 3 管	メイン	3 0 分
		3	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	130 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～15朝	内服薬	カベスタピン錠 300	<1.36m ² 8錠/日、1.36-1.66m ² 10錠/日、1.66-1.96m ² 12錠/日、≧1.96m ² 14錠/日：1日2回		
XELOX + アバスチン（3週ごと）：初回		1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	ブライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 1 0 0 m L	7.5 mg /kg 1 キット	メイン	9 0 分
		4	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 3 管	メイン	3 0 分
		5	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5 % 2 5 0 m L	130 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
XELOX + アバスチン（3週ごと）：2回目以降	day1タ～15朝	6	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
		内服薬	カペシタビン錠300	<1.36㎡8錠/日、1.36-1.66㎡10錠/日、1.66-1.96㎡12錠/日、≧1.96㎡14錠/日：1日2回		
		1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 50 mL	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100 mL	7.5 mg /kg 1 キット	メイン	60分
		4	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3.3 mg	1 袋 3 管	メイン	30分
		5	オキサリプラチン点滴静注液 糖液 5% 250 mL	130 mg /㎡ 1 袋	メイン	120分
		6	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	抜針用
	day1タ～15朝	内服薬	カペシタビン錠300	<1.36㎡8錠/日、1.36-1.66㎡10錠/日、1.66-1.96㎡12錠/日、≧1.96㎡14錠/日：1日2回		
XP（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		3	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		4	マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶	メイン	60分
		5	プロイメンド点滴静注用 150 mg 生理食塩液 100 mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		6	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注射液 3.3 mg	1 袋 3 管	メイン	15分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 500 mL	80 mg /㎡ 1 袋	メイン	120分
		8	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		9	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		10	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		11	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	ロック用
	day2、3	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
		3	デキサート注射液 3.3 mg 生理食塩液 100 mL	3 管 1 キット	メイン	30分
		4	生理食塩液 500 mL	1 袋	メイン	90分
	day1タ～15朝	5	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	ロック用
		内服薬	カペシタビン錠300	1000 mg /㎡/回 1日2回		
SOX + アバスチン（3週ごと）：初回	day1	1	生食注シリンジ 20 mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3.3 mg	1 袋 3 管	メイン	30分
		3	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100 mL	7.5 mg /kg 1 キット	メイン	90分
		4	生理食塩液 50 mL	1 瓶	メイン	全開

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		5	オキサリプラチン点滴静注液 糖液5% 250mL	130 mg /m ² 1 袋	メイン	120分
		6	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	全開
	day1夕～15朝	内服薬	S-1	(＜1.25m ²) 80mg/日、 (1.25～1.5m ²) 100mg/日、 (≧1.5m ²) 120mg/日：1日2回		
SOX + アバスチン（3週ごと）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	30分
		3	アバスチン点滴静注 生理食塩液100mL	7.5 mg /kg 1 キット	メイン	60分
		4	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	全開
		5	オキサリプラチン点滴静注液 糖液5% 250mL	130 mg /m ² 1 袋	メイン	120分
		6	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	全開
	day1夕～15朝	内服薬	S-1	(＜1.25m ²) 80mg/日、 (1.25～1.5m ²) 100mg/日、 (≧1.5m ²) 120mg/日：1日2回		
TC（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 2 管	メイン	30分
		3	ドセタキセル点滴静注 糖液5% 250mL	70 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		4	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	流し
		5	注射用エンドキサン500mg 生理食塩液100mL	600 mg /m ² 1 キット	メイン	30分
		6	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	全開
	day2～3	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
ドセタキセル（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 2 管	メイン	30分
		3	ドセタキセル点滴静注 糖液5% 250mL	60 mg /m ² 1 袋	メイン	60分以上
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～3朝	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
ドセタキセル + S-1（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	グラニトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 2 管	メイン	30分
		3	ドセタキセル点滴静注 糖液5% 250mL	40 mg /m ² 1 袋	メイン	60分以上
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～3朝	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
ナベルピン（2投1休）	day1、8	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		2	デキサート注射液 3. 3 m g 生理食塩液 5 0 m L	1 管 1 瓶	メイン	1 5 分
		3	ナベルピン注 生理食塩液 5 0 m L	25 mg /m ² 1 瓶	メイン	全開 5 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
ハラヴェン（1投1休）	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		3	ハラヴェン静注 生理食塩液 5 0 m L	1.4 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 0 分以内
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
ハーセプチン（3週ごと）：初回	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	1 5 分
		3	ハーセプチン注射用 生理食塩液 2 5 0 m L	8 mg /kg 1 袋	メイン	9 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
ハーセプチン（3週ごと）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	1 5 分
		3	ハーセプチン注射用 生理食塩液 2 5 0 m L	6 mg /kg 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
ハーセプチン+ドセタキセル（3週ごと）：初回	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		3	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット	メイン	3 0 分
		4	ドセタキセル点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	60 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分以上
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用
		6	ハーセプチン注射用 生理食塩液 2 5 0 m L	8 mg /kg 1 袋	メイン	9 0 分
		7	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～3朝	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠 1日2回		
ハーセプチン+ドセタキセル（3週ごと）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注パッゲ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 2 管	メイン	3 0 分
		3	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット	メイン	3 0 分
		4	ドセタキセル点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	60 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分以上
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		6	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	6 mg /kg 1 袋	メイン	60分
		7	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day1夕～3朝	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
パクリタキセル（3投1休）	day1、8、15	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg ファモチジン注用20mg ポララミン注5mg/1mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	パクリタキセル注 糖液5% 250mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル（初回）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	パージェタ点滴静注 生理食塩液250mL	840 mg /Body 1 袋	メイン	60分
		3	生理食塩液200mL	1 瓶 90分経過観察	メイン	90分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	90分
		5	生理食塩液200mL	1 瓶 90分経過観察	メイン	90分
		6	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 2 管	メイン	15分
		7	ドセタキセル点滴静注 糖液5% 250mL	75 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		8	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day2～3	内服薬	デカドロン錠0.5mg	16 錠 1日2回		
パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル（2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	パージェタ点滴静注 生理食塩液250mL	420 mg /Body 1 袋	メイン	30分以上
		3	生理食塩液100mL	1 キット 60分経過観察	メイン	60分
		4	ハーセプチン注射用150 生理食塩液250mL	6 mg /kg 1 袋	メイン	60分以上
		5	生理食塩液100mL	1 キット 60分経過観察	メイン	60分
		6	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 2 管	メイン	15分
		7	ドセタキセル点滴静注 糖液5% 250mL	75 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		8	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day2～3	内服薬	デカドロン錠0.5mg	16 錠 1日2回		
パージェタ+ハーセプチン（2回目以降）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		2	パージェタ点滴静注 生理食塩液250mL	420 mg /Body 1 袋	メイン	30分以上
		3	生理食塩液100mL	1 キット	メイン	30分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	6 mg /kg 1 袋	メイン	60分以上
		5	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
ハーセプチン+シスプラチン+S-1（3週毎）：初回	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		3	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	90分
		5	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		6	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	15分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液500mL	60 mg /m ² 1 袋	メイン	120分
		8	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		9	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		10	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		11	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	ロック用
	day2、3	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		3	デキサート注射液3.3mg 生理食塩液100mL	3 管 1 キット	メイン	30分
		4	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
	day1～14	5	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	ロック用
		内服薬	S-1	40~60 mg /m ² 1日2回		
ハーセプチン+シスプラチン+S-1（3週毎）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		3	生理食塩液500mL	1 袋	メイン	90分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	6 mg /kg 1 袋	メイン	60分
		5	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		6	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	15分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液500mL	60 mg /m ² 1 袋	メイン	120分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		8	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		9	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		10	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day2、3	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	デキサート注射液 3. 3 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	3 管 1 キット	メイン	3 0 分
		4	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day1～14	内服薬	S-1	40～60 mg /m ² 1日2回		
ハーセプチン+シスプラチン+ゼロータ [*] （3週毎）：初回	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液 2 5 0 m L	8 mg /kg 1 袋	メイン	9 0 分
		5	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		6	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 3 管	メイン	1 5 分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 5 0 0 m L	60 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		9	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		10	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day2、3	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	デキサート注射液 3. 3 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	3 管 1 キット	メイン	3 0 分
		4	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day1夕～15朝	内服薬	カベシタビン錠 300	1000 mg /m ² /回 1日2回		
ハーセプチン+シスプラチン+ゼロータ [*] （3週毎）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		4	ハーセプチン注射用 1 5 0 生理食塩液 2 5 0 m L	6 mg /kg 1 袋	メイン	6 0 分
		5	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g	1 瓶	メイン	3 0 分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット	メイン	3 0 分
		6	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 3 管	メイン	1 5 分
		7	シスプラチン点滴静注 生理食塩液 5 0 0 m L	60 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		9	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		10	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day2、3	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	フラッシュ用
		2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		3	デキサート注射液 3. 3 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	3 管 1 キット	メイン	3 0 分
		4	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋	メイン	9 0 分
		5	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	ロック用
	day1タ～15朝	内服薬	カベンタピン錠300	1000 mg /m ² /回 1日2回		
パージェタ+ハーセプチン+パクリタキセル（3週毎）：初回	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	パージェタ点滴静注 生理食塩液 2 5 0 m L	840 mg /Body 1 袋	メイン	6 0 分
		3	生理食塩液 2 0 0 m L	1 瓶 9 0 分経過観察	メイン	9 0 分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液 2 5 0 m L	8 mg /kg 1 袋	メイン	9 0 分
		5	生理食塩液 2 0 0 m L	1 瓶 9 0 分経過観察	メイン	9 0 分
		6	ゲラニト点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		7	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	80 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		8	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day8、15	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニト点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g ファモチジン注用 2 0 m g ボララミン注 5 m g / 1 m L	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	3 0 分
		3	パクリタキセル注 糖液 5 % 2 5 0 m L	80 mg /m ² 1 袋	メイン	6 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
パージェタ+ハーセプチン+パクリタキセル（3週毎）：2回目以降	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
		2	パージェタ点滴静注 生理食塩液250mL	420 mg /Body 1 袋	メイン	60分
		3	生理食塩液200mL	1 瓶 60分経過観察	メイン	60分
		4	ハーセプチン注射用 生理食塩液250mL	8 mg /kg 1 袋	メイン	90分
		5	生理食塩液200mL	1 瓶 60分経過観察	メイン	60分
		6	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg ファモチジン注用20mg ポララミン注5mg/1mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		7	パクリタキセル注 糖液5% 250mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		8	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day8、15	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液3.3mg ファモチジン注用20mg ポララミン注5mg/1mL	1 袋 2 管 1 管 1 管	メイン	30分
		3	パクリタキセル注 糖液5% 250mL	80 mg /m ² 1 袋	メイン	60分
		4	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
FEC100（3週ごと）	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		3	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液3.3mg	1 袋 3 管	メイン	15分
		4	エピルビシン塩酸塩注射液 生理食塩液50mL	100 mg /m ² 1 瓶	メイン	10分～20分
		5	生理食塩液50mL	1 瓶	メイン	流し
		6	5-FU注 生理食塩液100mL	500 mg /m ² 1 キット	メイン	30分
		7	注射用エンドキサン 生理食塩液100mL	500 mg /m ² 1 キット	メイン	30分
		8	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	16 錠 1日2回		
FOLFOX4	day1	1	生食注シリンジ20mL	1 筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用150mg 生理食塩液100mL	1 瓶 1 キット	メイン	30分
		3	ゲラニトロン点滴静注バッグ3mg/100mL	1 袋	メイン	30分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			デキサート注射液 3. 3 m g	1 管		
		4	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		5	オキサリプラチン点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	85 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		6	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		7	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
	day2	8	グラネトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		9	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		10	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		11	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
		12	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠	1日2回	
F O L F I R I	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		3	グラネトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		4	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液 5 0 0 m L	200 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		5	イリノテカン塩酸塩点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	150 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		6	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		7	5－F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
	day2	8	5－F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
		9	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠	1日2回	
ベクティビックス＋F O L F O X 4	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	ベクティビックス点滴静注	6 mg /kg	メイン	6 0 分

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
			生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット		
		4	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	オキサリプラチン点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	85 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		8	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		9	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
	day2	10	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		11	レボホリナート点滴静注用 糖液 5 % 2 5 0 m L	100 mg /m ² 1 袋	メイン	1 2 0 分
		12	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		13	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 0 m L	600 mg /m ² 1 袋	メイン	2 1 時間
		14	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day3～4	内服薬	デカドロン錠 0.5mg	8 錠 1日2回		
ベクティビックス＋FOLFIRI	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	ベクティビックス点滴静注 生理食塩液 1 0 0 m L	6 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		4	プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g 生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶 1 キット	メイン	3 0 分
		5	ゲラニトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL デキサート注射液 3. 3 m g	1 袋 1 管	メイン	3 0 分
		6	レボホリナート点滴静注用 生理食塩液 5 0 0 m L	200 mg /m ² 1 袋	側管	1 2 0 分
		7	イリリチン塩酸塩点滴静注 糖液 5 % 2 5 0 m L	150 mg /m ² 1 袋	メイン	9 0 分
		8	5－F U 注 糖液 5 % 5 0 m L	400 mg /m ² 1 瓶	メイン	1 5 分以内
		9	5－F U 注 生理食塩液 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間

レジメン名称〈がん腫〉	投与スケジュール	投与順	薬剤名	投与量	ルート	時間・速度
	day2	10	5－F U 注 大塚生食注 5 0 0 m L	1200 mg /m ² 1 袋	メイン	2 4 時間
		11	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用
	day2～4	内服薬	デカドロン錠0.5mg	8 錠 1日2回		
ペクティビックス（単独）：2 週毎	day1	1	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	穿刺用
		2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶	メイン	プライミング用
		3	ペクティビックス点滴静注 生理食塩液 1 0 0 m L	6 mg /kg 1 キット	メイン	6 0 分
		4	生食注シリンジ 2 0 m L	1 筒	メイン	抜針用